



GDS
Haute-Marne

FICHE TECHNIQUE

Soins à l'agnelage

08/2026



La période d'agnelage est une étape particulièrement exigeante, durant laquelle il est essentiel de veiller à la fois au bon déroulement des mises bas et à la santé des agneaux nouveau-nés. Les soins à la naissance, la gestion des lots ou encore le suivi des animaux sont autant de tâches qui requièrent rigueur, vigilance et organisation.

Avant l'agnelage

L'anticipation des agnelages est primordial pour que la période se passe en toute tranquillité. Assurez-vous d'avoir en votre possession tout le matériel utile :

- Gants ;
- Désinfectant
- Thermomètre ;
- Colostrum de secours si besoins, etc.

Afin de limiter toute infection des agneaux, la case doit être correctement paillée.

Précautions



La mise bas est un moment propice pour divers pathogènes, que ce soit pour les animaux ou pour l'humain. Certaines maladies comme la fièvre Q sont transmissibles à l'humain ("**zoonoses**"). C'est pourquoi il est fortement recommandé d'effectuer toute manipulation lors de l'agnelage (mise bas difficile, retournement de matrice, etc.) avec des gants à minima et ce surtout dans les élevages touchés par une maladie abortive.

Pendant l'agnelage

Il n'est pas toujours utile d'intervenir durant une mise-bas. En revanche, il est intéressant de reconnaître certains signes qui présagent un agnelage difficile.

Parmi eux :

- Détection d'un mauvais positionnement de l'agneau ;
- Aucun signe de progression environ 45 min après la perte des eaux ;
- Aucune membrane n'est visible malgré les efforts de la brebis ;
- Deuxième agneau ne sort toujours pas après plus d'un quart d'heure d'efforts.

Si vous notez la présence d'écoulements malodorants et sombres, c'est peut-être le signe d'un agneau mort. Veillez à vous désinfecter les mains et mettre des gants pour les manipulations.



Après l'agnelage

Les priorités :

- S'assurer que l'agneau respire ;
- Maintenir l'agneau à bonne température ;
- Désinfection du nombril : à réaliser autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le nombril soit sec. Un cordon qui s'infecte peut provoquer des arthrites ;
- S'assurer que la tétée du colostrum est réalisée : L'intestin de l'agneau absorbe ces anticorps juste après la naissance. Après 6 heures, cette capacité baisse beaucoup. Après 24 heures, l'intestin devient totalement étanche aux anticorps. C'est pourquoi **il est vital de s'assurer de la prise de colostrum** et de surveiller que la brebis laisse boire son petit.



Le saviez-vous ?

Pour connaître la **qualité d'un colostrum**, il est possible d'utiliser un **réfractomètre**. Une goutte de colostrum placée sur une petite plaque de verre suffit pour savoir si le colostrum est de bonne qualité. **Un très bon colostrum se situe au dessus de 23° Brix.**

Les signes qui doivent alerter

Chez l'agneau :

- Ne se lève pas ;
- Ne parviens pas à téter ;
- Respiration anormale ;
- ventre vide (pas de prise de colostrum / lait).

Il est important de redoubler d'attention pour les agneaux issus de portées multiples.

Chez la brebis :

- Repousse son agneau ;
- Prolapsus ;
- Pertes vaginales anormales.

Conseils d'éleveurs

« J'ai une réserve de colostrum de vache. Avant de le congeler ou de l'utiliser, je vérifie sa qualité au réfractomètre : je garde uniquement les colostrums qui affichent plus de 24 °Brix. »

« Quelques jours après la naissance, je donne un peu d'huile de foie de morue aux jeunes pour les aider à bien démarrer. Je reste aussi attentif aux premiers signes de problèmes digestifs : un agneau qui salive peut être un signe de colibacillose et mérite une surveillance particulière. J'utilise de l'argile pour les brebis afin de limiter les risques de diarrhée chez les agneaux. »



Pour plus d'informations contactez votre GDS

 03.25.35.03.83  gds52@gds52.fr  www.gds52.com