



FICHE TECHNIQUE

Bonne gestion des parasites internes en élevage ovin

08/2026



Les parasites internes sont nombreux chez les petits ruminants et peuvent engendrer des maladies aux conséquences importantes s'ils ne sont pas maîtrisés. Strongles gastro-intestinaux et pulmonaires, paramphistome, ténia, grande ou petite douve, coccidie, oxyure ... autant de parasites internes pouvant entraîner une baisse de production, un ralentissement de la croissance et parfois la mort de l'animal.

Symptômes

Pathologie	Symptômes	Lutte
Strongylose digestive	Anémie (muqueuses claires) / diarrhée noire, douleurs abdominales	Utilisation raisonnée de vermifuges, rotation des prairies et prairies saines
Strongylose respiratoire	Toux, amaigrissement, sous production, intolérance aux efforts	Utilisation raisonnée de vermifuges, isolement des animaux malades au sec en bergerie, rotation des prairies, éviter les zones humides
Monieziose (ténia)	Rares chez les adultes : perte d'état, diarrhée intermittente, troubles de la rumination, anneaux blancs dans les déjections (tagliatelles)	Utilisation raisonnée de vermifuges
Cénurose / cysticerose (ténia)	Troubles neurologiques : tournis / perte de vision / tête penchée) / kystes au coeur	Lié au ténia du chien, penser à vermifuger les chiens de troupeau et de compagnie



Pathologie	Symptômes	Lutte
Coccidiose	Diarrhée verdâtre ou noirâtre, laine piquée et retard de croissance	Laver et désinfecter la bergerie avec un produit efficace contre les oocytes, utilisation raisonnée d'anticoccidien
Paramphistomose	Diarrhée parfois noirâtre, perte de poids, baisse d'appétit, abattement	Utilisation raisonnée de vermifuges, rotation des prairies et prairies saines
Fasciolose (grande douve)  Zoonose	Forme aiguë : mort subite / abattement sévère Forme chronique : anémie / amaigrissement / oedème sous la mâchoire	Utilisation raisonnée de vermifuges, rotation des prairies et prairies saines, éviter les zones humides

Les ovins pâturent jusqu'au ras de l'herbe, ce qui augmente le risque d'infestation parasitaire. Dans la mesure du possible, éviter de laisser les animaux sur la même pâture trop longtemps.



Le saviez-vous ?

Lors du traitement antiparasitaire contre le ténia, les animaux infestés libèrent une grande quantité d'œufs dans leurs excréments. Pour ne pas contaminer les pâtures avec ces œufs, il est conseillé de laisser les ovins en intérieur durant les **3 jours suivants le traitement** et de ne pas épandre le fumier sur les parcelles pâturées.

Le bon réflexe

Un animal perd de l'état ? Vous suspectez que des parasites internes sont en cause ? **Avant d'effectuer un traitement antiparasitaire, faites une analyse coproscopique !** Cela vous permettra de traiter en sachant précisément quel.s parasite.s cibler. Traiter un animal affaibli avec le mauvais produit participera à le rendre encore plus vulnérable.

De plus, le fait de **traiter systématiquement les animaux contribue à l'apparition de résistances au sein du troupeau**, ce qui compliquera la lutte plus tard dans le cas où l'animal sera véritablement infesté par le parasite cible du produit.



Pour plus d'informations contactez votre GDS



03.25.35.03.83



gds52@gds52.fr



www.gds52.com